

# Cancers de l'anus

## LES FACTEURS DE RISQUE

Ils sont différents de ceux des cancers colorectaux. Les principaux facteurs de risque établis sont les suivants :

L'infection au papillomavirus (HPV - *Human Papillomavirus Virus*) et les condylomes. Les HPV16 et 18 sont présents dans 90 % des tumeurs et seraient à l'origine de 80 % des cancers de l'anus ! Ceci justifie un dépistage chez les femmes à risque (infection HPV, infection par le VIH, antécédents de néoplasie intraépithéliale de la vulve de grade 3 (NIV3), de néoplasie intraépithéliale vaginale de grade 3 (NIVa3), de cancer de la vulve ou de cancer du vagin, ou présentant une immunosuppression)

Un antécédent de cancer du col de l'utérus, de la vulve ou du vagin

Les antécédents de maladies sexuellement transmissibles (MST)

La séropositivité HIV

Les pratiques sexuelles à risque et des partenaires sexuels multiples

Une immunodépression après une greffe d'organe

D'autres facteurs de risque entrant en jeu sont :

Le tabagisme

Les habitudes sexuelles

Le SIDA pour lequel la fréquence du cancer de l'anus est multiplié par 43...

L'utilisation prolongée de cortisone ou de corticoïdes

### Populations à risque

Personnes vivant avec le VIH

Personnes ayant des relations sexuelles anales

Lésions dysplasiques anales ou génitales HPV induites


Carcinome HPV induit génital ou ORL

Transplantation d'organe solide

Maladie de Crohn notamment en cas de lésions ano-périnéales associées

Maladies auto-immunes (lupus)

Immunodépression acquise ou induite.



## Le Papillomavirus humain (HPV)

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/appareil-digestif/autres-cancers-du-tube-digestif/cancer-de-l-anus.html/>