

Cancer de la verge (pénis)

LA STADITIFICATION TNM DE 2017

LE CONTEXTE

Il s'agit d'un cancer très lymphophile qui peut toucher rapidement les ganglions superficiels et profonds, de l'aîne (triangle de Scarpa*), puis les ganglions iliaques. A distance, les métastases sont volontiers pulmonaires ou hépatiques.

LES VALEURS DE T,N,M

Tumeur T	Ganglion(s) N	Métastase(s) M
<p>T0 pas de tumeur palpée Tis <i>in situ</i> Ta : verruqueux non infiltrant T1 : envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial - T1a G 1-2 sans invasion lymphovasculaire - T1b G 3-4 ou invasion lymphovasculaire T2 : envahissant le corps spongieux ou caverneux T3 : envahissant l'urètre T4 : envahissant d'autres structures adjacentes</p> <p>Grade G</p> <p>G1 : bien différencié G2 : moyennement différencié G3 : faiblement différencié G4 : indifférencié</p>	<p>N0 Pas de ganglion inguinal palpé N1 Palpation d'un seul ganglion unilatéral mobile N2 Palpation de ganglions multiples ou bilatéraux mobiles N3 Ganglions inguinaux fixés ou ganglions pelviens, unilatéraux ou bilatéraux</p>	<p>M0 Pas de métastase à distance M1 Métastases à distance</p>

L'UICC 2017 décrit 4 stades, définis en fonction de la taille de la tumeur.

Stade	T	N
0is	Tis	N0
0a	Ta	
I	T1a (tumeur limitée au gland ou au prépuce)	
IIA IIB	T1b – T2 T3 (infiltration des corps caverneux)	
IIIA IIIB	T1-3 T1-3 (présence d'adénopathies métastatiques)	N1 N2
IV (métastases viscérales)	T4 Tout T Tout T	Tout N N3 Tout N M1

* Antonio Scarpa (1752 – 1832) chirurgien et anatomiste italien

