

# Chimiothérapie

## LES PROTOCOLES DE CHIMIOTHÉRAPIE, EN PRATIQUE

Protocoles	En pratique...
<b>LV5FU2</b>	Acide folinique 200 mg/m <sup>2</sup> en 2 h puis 5-FU 400 mg/m <sup>2</sup> en 10 min, puis 5-FU 1 200 mg/m <sup>2</sup> en perfusion continue de 44 h dans infuseur portable (5 ml/h), pompe ou pousse-seringue portable ; à J2, clamber infuseur de H24 à H26 pour passer acide folinique (AF) en 2 heures et 5-FU bolus idem à J1 ; tous les 14 jours
<b>LV5FU2 simplifié</b>	Acide folinique 400 mg/m <sup>2</sup> (ou l-folinique 200 mg/m <sup>2</sup> ) en 2 h puis 5-FU 400 mg/m <sup>2</sup> en 10 min G 5 % puis 5-FU 2400 mg/m <sup>2</sup> en perfusion continue de 44 h par infuseur portable (5 ml/h), pompe ou pousse seringue portable
<b>FOLFOX 4</b>	Oxaliplatine + LV5FU2 Oxaliplatine 85 mg/m <sup>2</sup> en 2 h en Y de l'acide folinique au J1 du LV5FU2 ; toutes les 2 semaines (12 cycles)
<b>FOLFOX6/ FOLFOX4 simplifié</b>	Oxaliplatine + LV5FU2 simplifié. Oxaliplatine 85 mg/m <sup>2</sup> en 2 h en Y de l'acide folinique au J1 du LV5FU2 ; toutes les 2 semaines (12 cycles)
<b>CAPOX/XELOX</b>	Oxaliplatine + capécitabine. Oxaliplatine 130 mg/m <sup>2</sup> en 2 h puis capécitabine (Xéroda) 2000 mg/m <sup>2</sup> /j (1000 mg/m <sup>2</sup> matin et soir), 2 semaines sur 3 (J2 à J15) ; toutes les 3 semaines

<b>Capécitabine seule</b>	2500 mg/m <sup>2</sup> /j (1250 mg/m <sup>2</sup> matin et soir), 2 semaines sur 3 (8 cycles = 24 semaines).
-------------------------------	--

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/appareil-digestif/cancer-colon-et-rectum/traitements/la-chimiotherapie.html/>