

Chimiothérapie

LES PROTOCOLES HABITUELS

Protocoles	En pratique, administration à
Capécitabine	J1 à J14 : capecitabine 1 250 mg/m ² , 2 fois par jour toutes les 3 semaines
LV5FU2 simplifié	J1 : AF 400 mg/m ² ; 5-FU _b (bolus) 400 mg/m ² ; 5-FU _c (continu par diffuseur portable) 2 400 mg/m ² sur 46 h toutes les 2 semaines
CAPOX	J1 : oxaliplatine 130 mg/m ² J1 à J14 : Capécitabine 1 000 mg/m ² , 2 fois par jour toutes les 3 semaines
FOLFOX4	J1 : oxaliplatine 85 mg/m ² ; AF 400 mg/m ² ; 5-FU _b 400 mg/m ² ; 5-FU _c 600 mg/m ² J2 : AF 400 mg/m ² ; 5-FU _b 400 mg/m ² ; 5-FU _c 600 mg/m ² toutes les 2 semaines
FOLFOX6m	J1 : oxaliplatine 85 mg/m ² ; AF 400 mg/m ² ; 5-FU _b 400 mg/m ² ; 5-FU _c 2 400 mg/m ² sur 46 h toutes les 2 semaines

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/appareil-digestif/cancer-colon-et-rectum/traitements/la-chimiotherapie.html/>