

Chimiothérapie

LES SCHÉMAS THÉRAPEUTIQUES HABITUELS

Les protocoles	En pratique pour vous...
FEC100 5-fluorouracile Epirubicine Cyclophosphamide	<p>J 1 et J8 : cyclophosphamide et 5-FU en une courte perfusion ; épirubicine injectée directement dans la tubulure</p> <p>Traitement pour prévenir les nausées</p> <p>Vous recommencez ce traitement à J28 - 3 ou 6 cures</p> <p>J1 uniquement toutes les 3 semaines - 8 cures</p>
FUN 5-fluorouracile Navelbine™	<p>J1 et J5 : vinorelbine en courte perfusion et J1 à J5 : 5-FU en perfusion continue</p> <p>Traitement pour prévenir les nausées</p> <p>Vous recommencez ce traitement à J21</p>
EpiTax Epirubicine Taxotère™	<p>La veille : cortisone pendant 3 jours de suite, pour éviter le risque d'œdèmes allergiques</p> <p>J1 : docétaxel (Taxotère™) en perfusion (1 heure) et épirubicine injectée directement dans la tubulure</p> <p>Traitement pour prévenir les nausées et parfois pour éviter les brûlures d'estomac</p> <p>Vous recommencez ce traitement à J21 ou 28</p>
FT 5-fluorouracile Taxotère™	<p>La veille : cortisone pendant 3 jours de suite, pour éviter le risque d'œdèmes</p> <p>J1 : docétaxel (Taxotère™) en perfusion (1 heure) et de J1 à J 5 : 5-FU en une courte perfusion</p> <p>Traitement pour prévenir les nausées et pour éviter les brûlures d'estomac</p> <p>Vous recommencez ce traitement à J21 ou 28</p>