

Le cancer de la vésicule biliaire

LES VALEURS T.N.M. (AJCC 2017)

T - Tumeur primitive	N - Adénopathies régionales
<p>TX tumeur primitive ne peut être évaluée</p> <p>T0 pas de tumeur primitive décelable</p> <p>Tis <i>in situ</i></p> <p>T1 envahissant la lamina propria ou la musculuse</p> <p> T1a envahissant la lamina propria</p> <p> T1b envahissant la musculuse</p> <p>T2 envahissant le tissu conjonctif périmusculaire sans extension au-delà de la séreuse ou dans le foie</p> <p> T2a le tissu conjonctif périmusculaire du côté hépatique sans extension à la séreuse</p> <p> T2b le tissu conjonctif périmusculaire du côté hépatique sans extension au foie</p> <p>T3 perforant la séreuse (péritoine viscéral) et/ou envahissant par contiguïté le foie et/ou un seul autre organe ou une seule autre structure de voisinage, par exemple, l'estomac, le duodénum, le côlon, le pancréas, l'épiploon, les canaux biliaires extra-hépatiques</p> <p>T4 envahissant le tronc principal de la veine porte ou de l'artère hépatique ou deux organes ou structures extra-hépatiques</p>	<p>NX non évalué</p> <p>N0 Pas d'adénopathie régionale métastatique</p> <p>N1 1 à 3 adénopathies régionales métastatiques</p> <p>N2 ? 4 adénopathies régionales métastatiques</p>

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/appareil-digestif/cancers-des-voies-biliaires-vesicule/le-cancer-de-la-vesicule-biliaire.html/>