

# Dépistage

## TABLEAU COMPARATIF : ERSPC VS. PLCO VS. ERSP

ERSPC (Europe) 1993- 2003	PLCO (USA) 1993 - 2001	ERSP (Suède) 1995 - 2008
<p>162 243 hommes de 55 à 69 ans Dépistés vs "contrôles" PSA tous les 4 ans Seuil pour BP 3 ng/mL Suivi 13 ans</p>	<p>76 693 hommes de 55 à 74 ans Dépistés vs "contrôles" PSA &amp; TR/an pendant 6 &amp; 4 ans Seuil pour BP 4 ng/mL Suivi 15 ans</p>	<p>32 898 hommes de 50 à 64 ans Dépistés vs "contrôles" PSA tous les 2 ans Seuil pour BP 3 ng/mL Suivi : 14 ans</p>
<p>Mortalité par cancer de la prostate Témoins 545 vs. dépistage 355 RRR = 21% (9 à 31 %) 30 % en tenant compte des non- compliance et des contaminations du bras contrôle Incidence : + 71% (dépistés) Stades avancés - 41 % 1410 à dépister et 48 à traiter pour éviter un décès 30 % de cancers insignifiants</p>	<p>Pas de différence en mortalité à 7 ans Incidence : + 17 % (dépisté) Stades avancés : pas de différence</p>	<p>50 % diminution de la mortalité spécifique à 14 ans entre les dépistés et les contrôles 1 décès évité pour 12 cancers détectés chez 293 dépistés</p>

<p>A 13 ans, réduction du risque absolu de décès :</p> <p>0,11 pour 1 000 personnes-années 1,28 pour 1 000 hommes Un décès par cancer de la prostate évité pour 781 (490 à 1 929) hommes dépistés</p>		
---	--	--

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/cancers-masculins/cancer-prostate/depistage-et-prevention/le-depistage.html/>