

# Suivi post-thérapeutique

## LES CRITÈRES D'ÉVOLUTIVITÉ DE LA MALADIE

L'existence de symptômes généraux (au moins un)	Syndrome tumoral volumineux	Hyperlymphocytose progressive avec :
<p>Perte de poids ? 10 % dans les 6 derniers mois</p> <p>Fièvre &gt; 38°C pendant 2 semaines ou plus, sans preuve d'infection</p> <p>Sueurs nocturnes sans preuve d'infection</p> <p>Fatigue significative</p>	<p>Rate volumineuse ou progressive</p> <p>Adénopathies volumineuses ou rapidement progressive ou symptomatique, ou hépatomégalie.</p>	<p>Augmentation &gt; 50 % sur 2 mois ou un temps de doublement des lymphocytes &lt; 6 mois</p> <p>Insuffisance médullaire progressive si traduisant par une anémie, une thrombocytopénie</p> <p>Anémie hémolytique auto-immune et/ou thrombocytopénie ne répondant pas aux corticoïdes ou à un autre traitement standard</p>

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/hemopathies-malignes-cancers-du-sang/leucemie-lymphoide-chronique/traitements/le-suivi-posttherapeutique.html/>