

# Cancers épidermoïdes (spinocellulaires)

## LES VALEURS DE T, N, M

Tumeur (T)	Ganglions lymphatiques régionaux (N)	Métastases à distance (M)
<p>TX : la tumeur primitive ne peut être évaluée</p> <p>T0 : pas de tumeur primitive identifiable</p> <p>Tis : carcinome <i>in situ</i></p> <p>T1 : &lt; 2 cm dans sa plus grande dimension</p> <p>T2 : 2 cm ? T ? 5 cm dans sa plus grande dimension</p> <p>T3 : &gt; 5 cm dans sa plus grande dimension</p> <p>T4 : tumeur envahissant les structures profondes : cartilage, os ou muscle strié</p>	<p>NX : les ganglions régionaux ne peuvent être évalués</p> <p>N0 : pas de métastase ganglionnaire régionale</p> <p>N1 : métastase ganglionnaire régionale a : micro-métastase b : macro-métastase unique dans l'aire &lt; 3 cm</p> <p>N2 : a : unique dans l'aire homolatérale &gt; 3 cm b : métastases multiples dans l'aire homolatérale c : métastases régionales intra-lymphatique (in transit ou satellites)</p> <p>N3 : a : métastases bilatérales ou controlatérales b : métastases ganglionnaire avec envahissement du facial ou de la base du crâne</p>	<p>MX : ne peuvent être évaluées</p> <p>M0 : pas de métastase</p> <p>M1 : métastase(s)</p>