

# Les différents stades

## TNM POUR LES CANCERS DE LA THYROÏDE (AJCC 2017)

TUMEUR T	GANGLIONS N	METASTASE(S) M
<p><b>T<sub>x</sub></b> non évaluée</p> <p><b>T<sub>1</sub></b> ? 2 cm ne dépassant pas la capsule thyroïdienne</p> <p><b>T<sub>1a</sub></b> : &lt; 1 cm</p> <p><b>T<sub>1b</sub></b> : 1 à 2 cm</p> <p><b>T<sub>1m</sub></b> : tumeur multifocale</p> <p><b>T<sub>2</sub></b> : 2 à 4 cm</p>	<p><b>N<sub>x</sub></b> : non évalué</p> <p><b>N<sub>0</sub></b> : absence de métastase dans les ganglions voisins</p> <p><b>N<sub>1a</sub></b> : adénopathies métastatiques régionales dans le compartiment central du cou</p> <p><b>N<sub>1b</sub></b> : adénopathies métastatiques régionales, cervicales uni-, bi- ou</p>	<p><b>M<sub>x</sub></b> : La présence ou l'absence des métastases distantes ne peut pas être établie</p> <p><b>M<sub>0</sub></b> : Pas de métastases</p> <p><b>M<sub>1</sub></b> : Métastases</p>
<p><b>T<sub>3</sub></b> &gt; 4 cm</p> <p><b>T<sub>3a</sub></b> &gt; 4 cm dans sa plus grande dimension mais limitée à la thyroïde</p> <p><b>T<sub>3b</sub></b> : toute taille avec extension extra-thyroïdienne touchant seulement les muscles avoisinant la thyroïde</p> <p><b>T<sub>4</sub></b> dépassant largement la capsule thyroïdienne</p> <p><b>T<sub>4a</sub></b> : vers tissu sous-cutané, larynx, trachée, œsophage, récurrent</p> <p><b>T<sub>4b</sub></b> : vers aponévrose prévertébrale ou des vaisseaux médiastinaux ou englobant l'artère carotide</p>	<p>controlatérales ou médiastinales supérieures</p>	

## Reliquat post-opératoire "R"...

A ces caractéristiques s'ajoute les résultats de la chirurgie relatifs à l'existence ou non d'un résidu tumoral **R**

**Rx** : résidu tumoral inconnu

**R0** : pas de résidu tumoral

**R1** : résidu tumoral microscopique

**R2** : résidu tumoral macroscopique

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/autres-types-de-cancers/cancer-thyroide/formes-de-la-maladie/les-differents-stades.html/>