Constitutionnels

RÈGLE POUR PRATIQUER DES TESTS GÉNÉTIQUES

Tests génétiques	Incidence	Pays/régions	Critères
Règle de 2	Faible à moyenne	Espagne, Grèce, 'Amérique latine	Au moins deux cas de mélanome chez des parents au premier ou au deuxième degré du même côté Deux mélanomes primitifs dont le premier diagnostic avant 60 ans Un mélanome primitif et un cancer du pancréas
Règle de 3	Moyenne-élevée	Italie du Nord, France, Royaume-Uni, États-Unis	Au moins trois cas de mélanome chez des parents au premier ou au deuxième degré du même côté Trois mélanomes primitifs dont le premier avant 60 ans Deux mélanomes primitifs et un cancer du pancréas
Règle de 4	Elevée	Par exemple, l'Australie	Au moins quatre cas de mélanome chez des parents au premier ou au deuxième degré Quatre mélanomes primitifs dont le premier diagnostic avant de 40 ans Trois mélanomes primitifs et un cancer du pancréas

Règle de 5	Très élevée	Par exemple, le Queensland	Au moins cinq cas de mélanome chez des parents au premier ou au deuxième degré Cinq mélanomes primitifs dont le premier avant l'âge de 40 ans Quatre mélanomes primitifs et un cancer du pancréas

https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/autres-types-de-cancers/melanome/facteurs-de-risque/les-facteurs-constitutionnels.html/