

# Stades de la maladie

## LES VALEURS T.N.M.

| TUMEUR T   | GANGLIONS N  | MÉTASTASES A DISTANCE M   |
|--|--|---|
| <p>TX ne peut être évaluée</p> <p>T0 pas de signe de tumeur primitive</p> <p>Tis <i>in situ</i></p> <p>T1 limitée au col de l'utérus</p> <p>    T1A : histologie</p> <p>    T1A1 Invasion du tissu conjonctif de &lt; 3 mm de profondeur et de &lt; 7 mm en diffusion horizontale</p> <p>    T1A2 Invasion du tissu conjonctif comprise entre 3 et 5 mm avec une diffusion horizontale de 7 mm au maximum</p> <p>    T1B visible limitée au col ou à lésions microscopiques supérieures à T1a2/IA2</p> <p>    - T1B1 &lt; 4 cm dans sa plus grande dimension</p> <p>    T1B2 &gt; 4 cm dans sa plus grande dimension</p> <p>T2 s'étendant au-delà du col mais sans atteindre les parois pelviennes ou le tiers inférieur du vagin</p> <p>    T2A sans infiltration du paramètre</p> <p>    T2B avec infiltration du paramètre</p> <p>T3 s'étendant à la paroi pelvienne, infiltrant le tiers inférieur du vagin, ou provoquant une hydronéphrose ou un rein muet</p> <p>    T3A + tiers inférieur du vagin, sans extension à la paroi pelvienne</p> <p>    T3B s'étendant à la paroi pelvienne ou présence d'hydronéphrose ou d'un rein muet</p> <p>T4 envahissant la muqueuse vésicale ou rectale ou s'étendant au-delà du petit bassin</p> | <p>NX impossible à classer</p> <p>N0 pas d'envahissement des ganglions lymphatiques régionaux</p> <p>N1 envahissement des ganglions lymphatiques régionaux</p> | <p>MX impossible d'apprécier la présence ou non de métastases à distance</p> <p>M0 pas de métastases à distance</p> <p>M1 métastases à distance</p> |

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/cancers-feminins/cancer-du-col-de-l-uterus/formes-de-la-maladie/les-stades-de-la-maladie.html/>