

Stades de la maladie

VALEURS DE T.N.M.(VERSION 2016)

TUMEUR (T)	GANGLION (N)	MÉTASTASE (M)
<p>T0 : tumeur primitive non retrouvée</p> <p>T1 : tumeur ni palpable au toucher rectal (TR), ni visible en imagerie</p> <p>T1a : < 5 % du tissu réséqué avec un score de Gleason 6 ou absence de grade 4 ou 5</p> <p>T1b : > 5 % du tissu réséqué ou un score de Gleason 7 ou présence de grade 4 ou 5</p> <p>T1c : découverte sur une biopsie prostatique en raison d'une élévation de la valeur du PSA</p> <p>T2 : tumeur limitée à la prostate</p> <p>T2a : atteignant la moitié d'un lobe ou moins</p> <p>T2b : atteignant plus de la moitié d'un lobe mais sans atteindre les deux lobes</p> <p>T2c : atteignant les deux lobes</p> <p>T3 : extension au-delà de la prostate</p> <p>T3a : extension extra-prostatique uni- ou bilatérale</p> <p>T3b : extension aux vésicules séminales uni- ou bilatérale</p> <p>T4 : fixée ou atteignant d'autres structures que les vésicules séminales (sphincter externe, rectum, muscle élévateur de l'anus ou la paroi pelvienne)</p>	<p>Nx : non évalués</p> <p>N0 : absence</p> <p>N1 : atteinte ganglionnaire régionale</p> <p>N1 mi : métastase ganglionnaire ? 0,2 cm</p>	<p>M0 : absence de métastase à distance</p> <p>M1 : métastases à distance</p> <p>M1a ganglions non régionaux</p> <p>M1b dans les os</p> <p>M1c autres sites</p>

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/cancers-masculins/cancer-prostate/formes-de-la-maladie/les-stades-de-la-maladie.html/>