

Tumeurs trophoblastiques

LA STADIFICATION

LE PRINCIPE

La classification de la FIGO (Fédération Internationale des Gynécologues et Obstétriciens) de 2000 définit quatre stades la maladie :

Stade I : Tumeur limitée au corps utérin (T1)

Stade II : Tumeur étendue au delà de l'utérus mais limitée aux structures génitales (vagin, ligaments) correspondant à (T2)

Stade III : Métastases pulmonaires (M1a) avec ou sans atteinte des organes génitaux

Stade IV : Métastases extra-pulmonaires (M1b)

LE SCORE FIGO 2002 PRONOSTIC

Il est souvent établi à partir des paramètres décrits dans le tableau ci-dessous.

La tumeur est à bas risque si le score est égal ou inférieur à 6, avec présence ou non de métastases.

La tumeur est considérée à haut risque si le score est égal ou supérieur à 7, avec présence ou non de métastases

Paramètres	0	1	2	4
Age	< 40 ans	> 40 ans		
Grossesse(s) antérieure(s)	Môle hydatiforme	Avortement spontané	Grossesse à terme	
Intervalle entre les grossesses	< 4 mois	4 à 7 mois	7 à 12 mois	Plus de 12 mois
HGC avant traitement	< 1000	1000 à 10 000	10 000 à 100 000	Plus de 100 000

Taille de la tumeur, utérus compris	< 3 cm	3 à 5 cm	Plus de 5 cm	
Métastases	Poumon	Rate, rein	Tube digestif	Cerveau, foie
Échec(s) de la chimiothérapie			seul médicament	2 ou plusieurs chimiothérapies

<https://www.arcagy.org/infocancer/localisations/cancers-feminins/cancers-gyn-cologiques-rares/tumeurs-trophoblastiques.html/>