



Cancers du sein
Cancers de l'ovaire
Soins de support

Ovaire en rechute tardive

(Intervalle libre sans traitement/platine au-delà de 6 mois)

RPC 3

A Floquet, D Berton Rigaud, G Ferron, G Freyer,
AC Hardy Bessard, B You.



Introduction

Cancers du sein
Cancers de l'ovaire
Soins de support

- **Tumeurs épithéliales de l'ovaire (trompe, péritoine) hors tumeurs rares de l'ovaire -> voir siteTMRO**
- **Premières lignes de rechute:**
 - 2^{ème} et 3^{ème} lignes de traitements
 - Aucune recommandation au delà de la 2^{ème} rechute
- **Ce qui n'a pas changé/1ères recommandations**
 - Types de protocoles de chimiothérapie
 - Favoriser l'accès à l'innovation et aux essais thérapeutiques



Introduction

- **Questions abordées:**
 1. Place de la chirurgie à la rechute
 2. Critères de choix du traitement médical
 3. Recommandations en cas d'allergie au carboplatine
 4. Algorithme de prise en charge



Question 1: Place de la chirurgie à la rechute tardive

Cancers du sein
Cancers de l'ovaire
Soins de support

- **Intérêt potentiel à la première rechute**
 - Essai randomisé prospectif DESKTOP III (en attente)
- **Critères de sélection pour chirurgie: restent à définir**
 - Critères AGO
 - > rechute tardive, ascite < 500 ml, chirurgie complète au primo-traitement, PS 0-1
- **Recommandations:**
 - Indication à discuter au cas par cas en RCP
 - Objectif: résection complète
 - Privilégier les équipes multidisciplinaires entraînées à la prise en charge des cancers de l'ovaire

ACCORD
D'EXPERTS




Question 1: Place de la CHIP à la rechute tardive

Il n'y a pas d'indication de CHIP en rechute hors
essai thérapeutique

ACCORD
D'EXPERTS



Question 2: Critères de choix du traitement médical





Question 3 :

Recommandations en cas d'allergie au carboplatine

Mesures pour une meilleure prise en charge

ACCORD
EXPERTS

- **Prévenir la patiente du risque**
- **Diagnostiquer et grader la sévérité des réactions**
- **Traiter les symptômes**
- **Faire un bilan avant de poursuivre**

Prise en charge par allergologue
BILAN allergie aux sels de platine
(importance du dosage de la tryptase)

Choix de poursuite du
platine

Stop platine

Désensibilisation
Utilisation d'un autre platine



Algorithme: critères de choix

I LIBRE

- 6 -12 m
- > 12 m

**ACCORD
D'EXPERTS**

**ANTI-ANGIO
AVANT**

**STATUT
BRCA**

**Nbre de LIGNES
AVANT**

**SYMPTOMES
Ascite?**



Schémas de chimiothérapie en rechute tardive

- **Combo avec Platine**
 - Taxol-carboplatine
 - DoxLipeg-carboplatine
 - Gemcitabine-carboplatine
- **Combo sans Platine**
 - DoxLipeg-Trabectédine
- **Combo avec Platine et Bevacizumab**
 - Carbo-gemcitabine + Bev (**Niveau 1 Grade A**) AMM
 - Paclitaxel-carbo + Bev (**Niveau 1 Grade A**) pas d'AMM
 - DoxLipeg-carbo + Bev (en cours d'évaluation essai AGO 2.21 clos)
- **Monothérapie par carboplatine**
 - En cas de co-morbidités (**accord experts**)



Algorithme de traitements

Problématique: choix de stratégie

Niveau 1 grade A (AMM)

- Gemcitabine-Carboplatine + bevacizumab (1^{ère} rechute, pas de Bev ant)
- Combinaison * avec platine (2^{ème} rechute, Bev ant)
- Combinaison* avec carboplatine suivie d' olaparib (mBRCA)

Options

- Si Bithérapie avec platine non souhaitée: platine seul (**accord experts**)
- Si platine non souhaité: trabectedine + DoxLipeg (**niveau 1 grade B**)

* taxol, doxLipeg, gemcitabine

1^{ère} Rechute

Mutation BRCA
Constitutionnelle/somatique

OUI

NON

Pré-traitement par Anti-Angiogénique

OUI

NON



OUI

NON

Combo avec P
suivie d'olaparib
(AMM)
Si non pré-traitée par
anti-Parp
(Niveau 1 Grade A)

OPTION
Platine non souhaité
Combo sans P
DoxLipeg-trabectédine
(Niveau 1 Grade B)

OPTIONS:

1- Carbo-gemcitabine+
Bev
(Niveau 1 Grade A)

2- Combo avec P suivie
d'Olaparib (AMM),
si non pré-traitée par
anti-Parp
(Niveau 1 Grade A)

OPTIONS:

1- Combo avec P
(Niveau 1- Grade A)

2- Combo sans P
DoxLipeg-trabectédine
(Niveau 1-Grade A)

Carbo-gemcitabine + Bev
(Niveau 1-Grade A)

OPTION
Platine non souhaité
Combo sans P
DoxLipeg-trabectédine
(Niveau 1-Grade B)

2^{ème} Rechute

OUI

Mutation BRCA
Constitutionnelle/somatique

NON

1- Combo avec P suivie d'Olaparib (AMM),
si non pré-traitée par anti-Parp
(Niveau 1- Grade A)

OPTION
-Combo sans P (si P pas souhaité)
DoxLipeg-Trabectédine
(Niveau 1-Grade B)



OPTIONS:
1- Combo avec P
(Niveau 1-Grade A)
2- Combo sans P
DoxLipeg-trabectédine
(Niveau 1-Grade B)